

Les maladies inflammatoires chroniques de l'enfant et manifestations osseuses

Auteurs : L.GARGOURI^{1,3}, I.ELAUD^{2,3*}, Y.HENTATI^{2,3}, W.FEKI^{2,3}, B.MAALEJ^{1,3}, F.SAFI^{1,3}
Z.MNIF^{2,3}, E.DAOUED^{2,3}, A.MAHFOUDH^{1,3}

1 : service de Pédiatrie, Urgences et de Réanimation pédiatriques, CHU Hédi Chaker, Sfax

2 : service d'imagerie médicale, CHU Hédi Chaker, SFAX

3 : Faculté de médecine, Université de Sfax, Tunisie.

***Adresse électronique : maynou.elaoud@hotmail.com**

OBJECTIF :

La localisation ostéoarticulaire constitue l'atteinte extradigestive la plus fréquente des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous rappelons, à travers trois cas, ces différentes manifestations tout en précisant leurs mécanismes, et leurs particularités cliniques, épidémiologiques et notamment radiologique dans la population pédiatrique.

PATIENTS ET METHODES :

Treize patients atteints de maladie inflammatoire chronique de l'intestin ont été suivis durant une période de 12 ans. Trois ont présenté une atteinte ostéo-articulaire.

RESULTAT :

Trois cas d'atteinte ostéoarticulaire ont été notés : une arthrite du genou inaugurant une maladie de Crohn , une ostéopénie, et une association d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale et d'une ostéoporose dans le dernier cas.

CONCLUSION :

Les manifestations extra-intestinales font des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin une affection inflammatoire systémique. L'atteinte ostéoarticulaire demeure la plus fréquente de ces manifestations.